

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Zakłady Chemiczne "Organika-Azot" S.A., ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno, telefon: (0-32) 616 44 42, fax: (0-32) 616 24 17, e-mail: rozwoj@azot.pl

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

MIEDZIAN 50 WG

Zawartość substancji aktywnej:

miedź w postaci tlenochlorku miedzi (miedzi(II)chlorurek-wodorotlenek)- 50 %.

Zezwolenie MRiRW nr R-58/2009 z dnia 04.05.2009 r.



Szkodliwy



Niebezpieczny
dla środowiska

Działa szkodliwie po połknięciu.

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Toksyczny dla pszczół.



Uwaga!

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.**
- 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.**

I OPIS DZIAŁANIA ŚRODKA

Miedzian 50 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie warzywnych przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

ROŚLINY WARZYWNE.

1. Ogórek (w gruncie).

Kanciasta plamistość dyniowatych, mączniak rzekomy dyniowatych.

Zalecana dawka: 2,5 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha.

Środek stosować zapobiegawczo 2-3 zabiegi co 7 dni, szczególnie w przypadku zagrożenia bakteryjną kanciastą plamistością ogórka.

2. Pomidor (w gruncie).

Bakteryjna cętkowość, zaraza ziemniaka.

Zalecane dawki: 2,5 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha.

Środek stosować 2-3 razy w sezonie co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Miedzian 50 WG stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach spodziewanego zagrożenia wystąpienia zarazy ziemniaka lub bakteryjnej cętkowości.

3. Pomidor (pod osłonami).

Bakteryjna cętkowość, zaraza ziemniaka.

Zalecane stężenie: 0,3 % (300 g środka w 100 litrach wody).

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 120 l/1000 m².

W przypadku dużego zagrożenia chorobami zabiegi należy rozpocząć już od fazy produkcji rozsady i po posadzeniu w miejscu stałym. Środek stosować 2-3 razy w sezonie co 7-10 dni, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Miedzian 50 WG stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach spodziewanego zagrożenia wystąpienia zarazy ziemniaka lub bakteryjnej cętkowości.

4. Fasola.

Bakterioza obwódkowa, antraknoza, szara pleśń.

Zalecana dawka: 3 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha

Zabiegi wykonywać od fazy 1-2 liści. Środek stosować zapobiegawczo wykonując 2-3 zabiegi w odstępach co 7 dni, zwłaszcza w przypadku zagrożenia chorobami bakteryjnymi.

UWAGI:

1. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
2. Wyższe dawki środka stosować w przypadku większego zagrożenia chorobą.

